

INFO PROFESSIONNELS DE SANTÉ

# STRATÉGIE DE COCOONING POUR LE NOURRISSON

## Principaux vaccins recommandés

Le « cocooning » consiste à protéger les nourrissons non encore vaccinés en vaccinant leur entourage.



### COQUELUCHE

*Privilégier la vaccination maternelle pendant la grossesse*

Repevax® ou Boostrix Tetra®  
Vaccins **tétravalents** inactivés dTcaPolio

#### Dans quels cas appliquer la stratégie cocooning ?

- Si absence de vaccin maternel pendant la grossesse.
- Si vaccin maternel réalisé moins d'un mois avant la naissance.

#### Qui vacciner ?

- La mère, si non vaccinée pendant la grossesse (vaccin compatible avec l'allaitement).
- Les parents, fratrie et autres personnes susceptibles d'être en contact étroit et durable avec le nourrisson au cours de ses 6 premiers mois : grands-parents, assistantes maternelles...

#### Quel schéma ?

- Si entourage non vacciné antérieurement : 1 dose.
- Si antérieurement vacciné et âgé de moins de 25 ans : 1 dose de rappel si la dernière injection date de plus de 5 ans.
- Si antérieurement vacciné et âgé de plus de 25 ans : 1 dose de rappel si la dernière injection date de plus de 10 ans.
- Le rappel se fait dans tous les cas à 25 ans.

Respecter un délai minimum d'un mois après le dernier vaccin dTPolio.



### VARICELLE

Varivax® et Varilrix®  
Vaccins vivants atténués

#### Qui vacciner ?

- Tout adulte sans antécédent de varicelle.
- Vaccins compatibles avec l'allaitement.

#### Quel schéma ?

- Varivax® : 2 doses espacées de 4 à 8 semaines.
- Varilrix® : 2 doses espacées de 6 à 10 semaines.



## ROUGEOLE - OREILLONS - RUBÉOLE (ROR)


Priorix® ou M-M-Rvaxpro®  
Vaccin vivant atténué

### Qui et quand vacciner ?

- Mère avec une sérologie rubéole prénatale inconnue ou négative :
  - immédiatement après l'accouchement ;
  - toujours avant la sortie de la maternité ;
  - à défaut, au plus tôt après la sortie ;
  - y compris en cas d'allaitement (en l'absence de suspicion ou confirmation d'immunodéficience chez l'enfant).
- Parent (ou co-parent) né après 1980 et qui n'a pas reçu 2 doses de vaccin ROR (pour protection rougeole).
- Les personnes en contact étroit et durable avec le nourrisson au cours de ses 6 premiers mois.

### Quel schéma ?

- Mise à jour conformément au calendrier vaccinal pour atteindre 2 doses de vaccin trivalent.
- Délai minimal d'un mois entre les doses.



## GRIPPE

### Quand vacciner ?

Durant la campagne de vaccination annuelle définie par le ministère de la santé.

### Qui vacciner ?

- Tous les parents de nourrissons.
- L'entourage des nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risque de grippe grave : prématurés, enfants atteints de bronchodysplasie, cardiopathie congénitale, déficit immunitaire congénital, pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire...
- Ces vaccins sont compatibles avec l'allaitement.

### Quel schéma ?

À adapter à l'âge de la personne et au type de vaccin administré.

## RESSOURCES

- [Ministère de la santé et de la prévention - Calendrier vaccinal 2023](#)
- [HAS - Recommandation vaccinale contre la coqueluche chez la femme enceinte](#)
- [Infovac.fr](#)
- [mesvaccins.net](#)

## GRUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL « GROSSESSE ET MÉDICAMENTS »

Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,  
Service médical Auvergne-Rhône-Alpes de l'Assurance  
maladie, OMEDIT, réseaux de périnatalité  
(RPAI, RP2S, RSPA, ELENA et AURORE),  
centres de pharmacovigilance, URPS sages-femmes,  
médecins libéraux, pharmaciens, et associations de patients.

